Suite au Catalogue de la Flore des Basses-Alpes particulièrement sur la rive droite de la Durance (3e partie)

Par Cl. Ch. Mathon.

F. rubra L. Lure (Legré) ; ssp. *eu-rubra* Hack. dans les pelouses à *Bromus erectus* ou à *Brachypodium pinnatum* de Lure (Cl. Ch. M.). *F. eurubra* Hack. var. *genuina* (Godr.) Hack. sub-var. *vulgaris* (Gaud.) Hack. R. de Lit.], dans la sarothamnaie des Graves du Contadour (Cl. Ch. M.).

F. spadicea L. Lure (Legré).

F. varia (Haenke) Hack. Lure (Legré).

Glyceria plicata Fries. Pierrerue (Legré).

Holcus mollis L. Lure (Legré).

Hordeum distichum L. — Paumelle. — Cultivé : Paillas, Coï (Cl. Ch. M.).

Hordeum murinum L. Les Daniels (reposoir de brebis sous *Sorbus Aria*) ; Ongles (avec *Ægylops ovata*) ; bord de route à Banon, à Paresoux ; place du Contadour ; etc... (Cl. Ch. M.).

Koeleria cristata Pers. Lure ; Pierrerue ? (Legré) ; *Mesobrometum* des Fraches du Contadour, et au Pas de Redortiers ; Pas de la Graille ; Cerveau ; *Brachypodietum pinnati* de la naissance de la Combe de l'Ours ; lande calcaire du Russel (Cl. Ch. M.).

K. setacea Pers. s. lat. Lure (et var. *glabra* G. G., et var. *ciliata*-, Legré) ; Revest St-M. (Legré) ; lavandaies et pelouses de Lure (la ssp. *alpicola* G. G., la var. *pubescens* G. G., et le type *K. Vallesiana* (Sut.) Gaud. ; — Cl. Ch. M.) ; Cervcau (*K. alpicola*, — Cl. Ch. M.).

Lolium perenne L. Prairies de fauche : Contadour, Valbelle, Péouilloue, Peipin ; dépression calco-marneuse à Valaurie de Villesèche (Cl. Ch. M.).

L. rigidum Gaud. Moisson au Contadour (Cl. Ch. M.).

L. temulentum L. var. *reptaehelon.* Lure (Legré).

Melica ciliata L. Lavandaies et éboulis à Lure ; Cerveau (Cl. Ch. M.).

M. glauca Schultz. Cerveau (Cl. Ch. M.).

M. Magnolii G. G. Lure (Legré).

M. Nebrodensis Parl. Lure (Legré).

Molinia caerula Moench. Lure ; Revest St-M. (Legré) ; lit du Jabron ; rare entre la Papeterie et le Pont Gournias ; le long du canal à Ganagobie ; fragments de *Molinietum* : Montlaux, Saint-Etienne, Revest St-M. (Cl. Ch. M.).

Nardurus Lachenali Spenn. Lavandaie à Châtaigniers de Montlaux ; var. *aristatus* dans la lande acide boisée de L'Ouvary (Cl. Ch. M.).

N. tenellus Rchb. Lure (Legré).

Phleum alpinum L. Lure (Legré).

Ph. nodosum L. Lure (Legré) ; forme la plus répandue de *Ph. pratense* à Lure : lavandaies cultivées et naturelles, prairies, pelouses, etc... ; Cerveau (Cl. Ch. M.).

Ph. praecox Jord. Lure (Legré).

Ph. pratense L. Le type est rare à Lure : lavandaie cultivée du Trait avec la forme *nodosum* (Cl. Ch. M.).

Ph. tenue Schrad. (= *Ph. subulatum* (Savi) A. et G.). Lure (Legré).

Poa alpina L. Lure (Legré). *Brachypodietum pinnati* de la patrie centrale et élevée de Lure ; Lavandaie naturelle de la Redoune ; Crête de Lure entre la côte 1827 et le Pas de la Graille (Cl. Ch. M.).

Poa bulbosa L. Cerveau et Lure, fréquemment sous la forme *vivipara* Koel. (Cl. Ch. M.).

Poa compressa L. Lure ; Revest St-M. (Legré) ; lavandaies, éboulis, chênaics blanches, etc..., à Lure (Cl. Ch. M.).

Poa laxa Hoecke. Lure (Legré).

Poa nemoralis L. Lure (et var. *bêta rigidula*, — Legré) ; lieux boisés : chênaies et hêtraies à Lure (Cl. Ch. M.).

Poa pratensis L. Revest St-M., Lure (Legré) ; *idem* : le type mais surtout la forme *angustifolia* Sm., espèce commune mais jamais abondante (Cl. Ch. M.).

Poa trivialis L. Lure (Legré) ; Contadour, Long-Terme, etc... (Cl. Ch. M.).

Secale cereale L. Lurs (Cl. Ch. M.).

Sclerocloa dura P. B. Bord de la route de Sisteron près de la gare de Lurs (Legré) ; aire à Valbelle (Cl. Ch. M.).

Sesleria caerulea Ard. Lure (Legré) ; falaise aux Bons Enfants ; crête élevée et centrale de Lure ; *Seslerietum* fragmentaire au Russel ; falaises du col des Jalinons ; pelouses à *Brachypodium pinnatum* dans la partie centrale de Lure ; pelouse à *Gentiana lutea* à l'E. de Morteiron ; falaise de La Baume à Sisteron ; etc... (Cl. Ch. M.).

Setaria viridis (L.) P. B. Saint-Etienne, Montlaux, dans les friches de l'année et les chaumes (Cl. Ch. M.).

Stipa pennata L. Lure ; Revest St-M. (Legré) ; pas très fréquent, surtout dans l'W., à Lure : Les Aubères, Les Bons Enfants, côte 1344 à l'E. du point culminant, Valbelle ; et çà et là : une touffe à Long-

Terme, au Pas de Redortiers, au Cerveau, au Pas des Portes, etc... (Cl. Ch. M.).

Trisetum distichophyllum P. B. Crête principale de Lure (C. Ch. M.).

Tr. flavescens P. B. Prairies de fuache, fumées, à *Arrhenatherum elatius* : Peipin, Contadour (Cl. Ch. M.).

Triticum sativum Lmk. « Saissette de Lure », parfois échappée des cultures (Cl. Ch. M.).

Tr. Spelta L. — Epeautre, — Lure (Cl. Ch. M.).

Zea Mays L. Cultivé à Lure, pas très commun ; dans les prairies chaudes et humides jusqu'au Coï (Cl. Ch. M.).

(A suivre).

Laboratoire de Phanérogamie du Muséum.